


Вакцинация от гриппа в эпидемический сезон 2018-2019

Основной акцент прививочной компании текущего года – это максимальный охват детского населения, начиная с 6 месячного возраста, вакцинация лиц с хроническими заболеваниями, организованных детей.

Для бесплатной иммунизации в поликлинику поступила вакцина **«Гриппол плюс» Россия**, содержащая в своем составе иммуномодулятор полиоксидоний (для *платной* вакцинации используется вакцина **«Инфлювак», Нидерланды**, стоимость 14,9 руб.).

Вакцина инактивированная (субъединичная) для внутримышечного введения, без консервантов. Антигенный состав вакцины, которая будет использоваться в 2017 году, изменен в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ: содержит поверхностные антигены вируса гриппа штаммов А(Н3N2, Н1N1) и В.



Единственный и эффективный способ предупреждения заболевания и его осложнений – это вакцинация.

Вакцины вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета (защиты) против гриппа.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 мес. Вот почему необходимо провести вакцинацию против гриппа до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. По прогнозу подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе-феврале 2019 года.

Вакцинация настоятельно рекомендуется определенным группам «риска»:

- дети до 3 лет,
- дети дошкольных образовательных учреждений, в том числе ясельных групп,
- школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений,
- медицинские работники, работники образовательных учреждений,
- лица с хроническими заболеваниями, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания (пневмонию, др.), с избыточной массой тела, часто и длительно болеющие, пр.
- дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Организованные дети (посещающие ДДУ, школы, гимназии) после получения информированного согласия от родителей на проведение вакцинации будут прививаться в своих учреждениях.

Противопоказаниями к проведению вакцинации против гриппа данной вакциной являются:

- острые аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины;
- острые лихорадочные состояния или обострения хронического заболевания (вакцинация проводится при выздоровлении или в период ремиссии);
- лицам, ранее имевшим аллергические реакции на введение гриппозных вакцин.

Помните, что заболевание легче предупредить, чем лечить!

«Горячая линия» по организации вакцинации против гриппа в 2018 году:

тел. 365-56-89

